

Verzeichniß von 1833

über ganz gefüllte Georginen, Kartoffel-Sorten und perennirende Landpflanzen,
welche um beigesetzte Preise zu haben sind

bei Christian Deegen zu Köstritz bei Gera.

Die Zahlung geschieht in preuß. Courant.

A. *Georgina variabilis* fl. plenissimo, dichtge-
füllteste Pracht-Georginen in allen neuen Formen und
Färbungen, als:

	Fußhöhe	gr
1 alba crispa, kraußblättrige weiße	6	8
2 sulphureo-flavesc. grandifl., große schwefelgelbe, äußerlich nanquinfarbige T.	5	6
3 flavescens, lebhaft nanquinfarbige	6	6
4 aurea sordida micans, trübgoldgelb-schimmernde T.	5	12
5 vitellino-erubescens. röthlich-dottergelbe	6	8
6 aurea, coccineo-variegata, goldfarb. scharlach überzogen	4	12
7 carmineo-lutescens amabilis, liebliche, gelb-carminr. T.	5	16
8 aurorans triflora, dreiblumige aurorefarbige	4	8
9 atropunicea sordida frondosa, überlaubte trüb-blutrothe	5	6
10 violacea pall. humilis, niedrige halbviolette	4	6
11 lilacino-albida suave caerulea, weißlich-lilaf. mit bläul. Schein	5	8
12 rosea spectabilis, ansehnliche rosafarbige	6	8
13 lilacina hyalina, lilafarbige, blaulich-durchscheinend	5	6
14 citrina pall. lucida, leuchtend hellzitrongelbe	6	8
15 coccin. holoserica, micans, schimm. scharlachf. m. Sammt	5	12
16 lilacino-caerulescens, hohe blaulilafarbige	7	8
17 violacea saturata, tief dunkelviolette	5	8
18 purpureo-violacea formosa, schöne dunkelviolettpurpurfarb.	5	8
19 Xerampelina, Herbstrothe	5	6
20 amethystea pall. stellata, sternförmige hellamethystblaue	5	12
21 coccinea praenitens, feurige ponceaufarbige	5	12
22 coccinea, suave livido-canesc., scharlachfarbige, über der Hälfte des Blattes kreisrund in mattgelbgrau übergehend	5	24
23 albida, roseo-hyalina, weißliche, hellrosa durchscheinend	3	8
24 lilacino-rosea, purp. flammea, vielblumige, lilafarbige, mit Purpur überflammt. T.	4	16
25 atrococeineo-purp. holosericea, frühblühende, dunkelschar- lach-purpurfarbige mit tiefem Sammt T.	4	12
26 lilacino-albida caeruleo-varieg., gr. baßlilf. m. bl. Spz.	5	16
27 aurea, lateritia picta floribunda, blumenreiche goldfarbi- ge, mit ziegelrothen Zeichnungen von Spizen herein T.	4	36
28 aurantiaca-miniata major, große, orangemennigrothe T.	4	8
29 aurea, erubesc. striata sphaer., knosf. goldf. m. roth gest.	5	8
30 lilac. incan., purpur. lin., purpurlin. a. graulilf. Gr. T.	5	20
31 carnea saturata, gesättigt hautfarbige	6	6
32 alba laciniata, schließblättrige weiße	5	6
33 chermesina vera, rein carmoisinrothe T.	5	6
34 cinnamomea fistulosa, röhrige zimmetbraune	5	6
35 violacea pallida multiflora, vielblühende hellveilchenblaue	4	6
36 atrosanguinea, nigro-holoserica, dunkelblutrothe, mit schwarzblauem Sammt überzogen T.	4	8
37 lilacina int. purp. tenella, sanfte lilafarbige, nach innen dunkelroth werdend T.	5	12
38 aurea-fulgescens, goldfarb. mit feuerrothen Anhauch	5	6
39 aurantiaca saturata canaliculat., rinnenblättr. dkelorange	7	8
40 albida, roseo-diluta lineata, weißliche, blaßrosa überwa- schen, mit glasartigen feinen Linien	5	36
41 badio-erubescens max., größte gelbbraunröthliche	6	6
42 caeruleo-holosericea altiss., höchste Sammtblaue	9	6
43 pulcherrima tricolor, schöne dreifarbige	6	6
44 aurantiaca speciosa, große, prächtig orangefarbige	6	12
45 carmineo-haematitica maj., große, röthelcarminrothe	5	8
46 camelino-flavesc. suave ros., gelbl. chamoisf. m. rosa Schein	4	12
47 cupreo-fuscata, kupferrothbraune	5	6

	Fußhöhe	gr
48 carmineo-chermesina fulgida, lilaceo-holosericea, präch- tig carminecarmoisinrothe, mit lilla Sammtschein	5	48
49 coccin. splend., glänz. scharlachr. (Cact. spec. ähnl.) T.	5	8
50 cupreo-violacea int. viresc., violettkupferf. in grünlich. T.	5	8
51 carnea sord. chermesino-picta, trübhautfarbige, mit kupf- rigen carmoisin überstrichen T.	5	16
52 lilacea, purp. venosa glob., kugelrunde, lilafarbige, mit purpurfarbigen Adern T.	5	20
53 alba nymphaeiformis, Seerosengestalt. weiße	4	6
54 sulphurea nitens, leuchtend schwefelgelbe	5	6
55 alba paradoxa, sonderbar gebaute, weiße	5	6
56 camelina, lilacino-varieg., chamoisf. m. lilla a. d. Spiz.	5	12
57 coccinea formosa, prächtige scharlachrothe	5	12
58 carminea saturata, tief carminrothe	6	8
59 caerulea, purp. picta, lichtblaue, m. Purp. überzeichn. T.	5	16
60 albida-canescens, striata, weißlichgrau mit Streifen	6	16
61 rosea amoena, angenehme rosenfarbige, mit kleinen weiß- streifigen Blättchen T.	5	16
62 asterisimilis lilacina subt. arg., Asterähnliche, lilafar- bige, unten silberweiß T.	4	12
63 roseo-diluta-sanguinea et flava striata, nelfengestaltige, dreifarbige, blutroth und gelbstreif. mit rosa verwaschen. T.	5	72
64 atrovioleacea, purp. venosa, dunkelveilchenblaue, mit dun- kelpurpurfarbigen Adern T.	7	12
65 atrochermesina crispa, kraußblättrige carmoisinrothe T.	5	6
66 cinnamomeo-erubesc. grandifl., große röthl. zimmtf. T.	5	16
67 xerampelina fusc. pleniss., dichtgef. bräunl. Xerampelin.	5	8
68 sulphureo-canescens, graulich schwefelgelbe	5	8
69 isabellino-lutescens, gelbliche isabellfarbige	6	8
70 rosea superba, große, prächtig rosafarbige	5	16
71 rubescens-luteo-striata max., größte, röthlich gelbstreifige	7	12
72 chermesina canescens, große, carmoisinr. m. grau getrübt	5	12
73 camelino-canescens, rubro-varieg., grau-chamoisfarbige, mit kreisrunden rothen Anhauch T.	5	16
74 atrosanguinea, purp. holosericea, große schwarzblutrothe mit purpurnen Sammt	6	8
75 carnea pallens caryophyll., nelfengestaltige, blaßhautfarb.	5	6
76 rosea suavis rosaeform., rosenähnl. prächtig rosafarb. T.	4	24
77 aureo, rubro-picta grandifl., große goldf. m. roth gez.	5	6
78 purpureo-caerulea plensima, dichtgef. dreiblum. purpurbl.	5	18
79 miniata pall. obsoleta., matt hellmennigrothe	5	6
80 lucida-canescens int. flavesc., graubleifarb. innen gelb	5	12
81 cuprea saturata grandifl., große dunkelkupferrothe	5	12
82 violacea purp. amoena, schöne violett-purpurfarbige	5	8
83 purpurea Reginae, königliche purpurfarbige	6	12
84 crocea saturata, tief safrangelbe	5	12
85 haematitica helianth., große, Sonnenros. ähnl. röthelr. T.	5	16
86 atropunicea multifl., vielblum. schwärzlich blutigrothe T.	4	6
87 croceo-miniata caule-nigro, dflstengel. saframmennigrothe	5	10
88 flavescens, carmineo-varieg., gelbl. m. carm. bunt schat.	5	16
89 ferrugineo-erubescens, papaveracea, ranunkelmohnähnl- che, röthlich-rysfarbige T.	5	20
90 rosea suave violacea subt. cerina, rosa, mit violett über- zogen, unten wachsgelb T.	4	12
91 caerulea-rosea rosaeform., rosenähnliche, lilafarfarbige	5	8
92 coccineo-fuscata corrusc., blendend bräunl. scharlachf. T.	5	10
93 sulphurea pall., blaßschwefelgelbe T.	5	6
94 asterisimilis lacteo-lilacina, asterähnliche weißl. lilafarbige	5	16

	Fußhöhe.	gr		Fußhöhe.	gr
95 fusco-cinerea int. lut., fahlrothgraue, innen gelb	6	10	159 aurea-canescens, bleichgoldfarbige in grau gezogen	5	10
96 amaranthacea altiss., hohe amaranthfarbige	7	8	160 alba-caerulescens, sanftweiße mit blaulichen Spizen T.	5	24
97 roseo-caerulesc. multifi., vielbl. rosafarb., in blau spielend	5	8	161 ochracea, rubra sordida, ackergelbe mit trüb. verw. T.	4	8
98 carmineo-hermesina lucida, leuchtend carmincarmosinr.	6	12	162 aurea floribunda, überaus reichlich blühende hochgelbe T.	4	12
99 aurea suave coccinea multifi., vielbl. goldf. mit Scharlach kaum bemerkbar überzogen	5	12	163 rosea argentea, rosa mit Silberglanz	5	12
100 candida, rein weiße	5	6	164 coccinea excellens, hervorglänzende scharlachrothe	7	10
101 coccinea spectab., ansehnliche scharlachrothe T.	4	12	165 rosea albicans, rosaeform., rosenähnl. blasrosafarbige T.	4	18
102 tropaeolo-similis., Tropaeolum gelbrothe	5	6	166 violacea, lilacino-varieg., große violett-lilabunte	6	12
103 coccinea, atrobadio-holoser., große scharlachrothe, mit schwarzbraunem Sammt überzogen	5	12	167 persicino-rubic. grandifi., große röthlich-hellpurpurblüthf.	6	6
104 aurea, fusco-varieg multifi., vielbl. goldf. m. graur. schat. T.	4	8	168 albo-lilic. marg., weißlichlilaf. m. dfln. Adern u. Saum	6	10
105 coccineo-sanguinea corrusc., blendend scharlachblutr. T.	5	10	169 lutea sordida erubescens, trübgelbe, röthlich angelaufen	6	8
106 cerino-fulvescens, wachsgelbbräunliche	5	8	170 lilacino-caerulea, holoser., vielbl. lilablau mit Sammt T.	5	8
107 coccinea saturata ranuncul., ranunkelähnl. dflscharlachf.	5	8	171 purpurea, albo-varieg., weißliche mit Purpur überwasch.	5	8
108 haematitica sanguin. grandifi., große dunkelröthelblutr. T.	5	12	172 chermesina splendens min., kleinste, leucht. carmosinr.	5	10
109 sanguinea holosericea, sammtige blutrothe	6	8	173 sulphurea, cerina multifi., vielbl., schwefelg., roth sch. T.	4	8
110 pallida rosea, albido-striata, verschämte sanftblasrosenfarbige mit weißen Streifen T.	5	12	174 luteo-lateritia, ziegelrothe ins gelbe ziehend	5	3
111 lateritia int. flavescens, ziegelrothe mit gelb, innen heraus verwaschen T.	5	8	175 lilacina albicans, weißliche mit lila umschlossen T.	5	12
112 persicina saturata rubro-margin., tiefpurpurblüthfarbige mit dunklern Einfas	6	12	176 atropurp. caerulesc., dunkelpurpurf. innen blau schimm.	5	8
113 purpureo-amaranthacea, purpuramaranthfarbige	5	8	177 ochrac. satur. mult., vielblum. zarte dunkelockerfarb. T.	4	16
114 chermesina pall. lilacino-distincte venosa, blascarmosinfarbige mit lilla scharfgeadert	4	12	178 lutea, rubro-variegata, gelb und rothbunte	5	8
115 carmin., alb. seminarg., weißl. mit carmin umschlossen	5	18	179 albida, rosea pallida semi-marg., kleine weißliche, mit blasrosa an Seiten und Spizen T.	5	1
116 lilacea int. albo canesc., lilafarbige, innen weißgraue	6	6	180 violacea int. alba, violette, nach innen weißlich	5	
117 flavo-fusca globularis. rundblum., gelblich-bräunliche	5	12	181 amaranth. holos. florib., reichbl. sammt. dflamarthf. T.	4	
118 camelino-lutescens, gelblich-chamoisfarbige	6	8	182 camelina flexuosa, chamoisfarbige mit gebogenen Blättern	5	6
119 punicea pumila. niedrige blutigrothe T.	3	8	183 aurea saturata nitida, leuchtend tiefgoldfarbige	5	16
120 sanguin., fusco-holoserice, blutr. m. braun. Sammt T.	5	16	184 violacea pall. albo-striata, blasviol. mit weißen Herzfr.	5	6
121 lateritio-flava multifi., vielblumige gelbziegelrothe T.	5	8	185 cerina, cinnabarina, wachsgelbe, nach innen zinnoberroth	5	8
122 chermes. amaranth. semifist. diethenf. dflamarthcarmosinr.	7	8	186 atrochermesina, fuscato-nigro-late marg., dunkelcarmosinrothe mit schwarzbraunem breiten Einfas	5	16
123 rosea tenella, zart hellrosenfarbige	5	16	187 violaceo-rosacea, violettrosafarbige	5	8
124 atroviolacea perfecta, vollendeste veilchenblaue	5	16	188 badia int. aurea, kastanienbraune, innen hochgelbe	5	8
125 purpureo-carminacea subt. viol., prächtige purpurcarminrothe, unten violett T.	4	16	189 atrocarm. viol. spl. sanftglanz. dunkelviolettcarm. T.	4	16
126 phoenicea int. aurea, schimmernd feuerrothe	5	6	190 atrosanguinea vera, rein dunkelblutrothe	5	8
127 rosea, lilacina latemarg., rosaf. m. breit. lilla Einfassung	6	16	191 flavo-erubescens, bunte dunkelgelbe mit roth überzogen	5	12
128 carminea crispa sphaerica, krause, carminrothe mit grünem Knospe	7	6	192 atrococcineo-brunea, holosericea canescens, sonnenrosenähnl., bräunl., scharlachrothe mit grauem Sammt T.	5	16
129 cereo-badio-rubra erecta, gelbbraunrothe T.	4	6	193 lilacino-canescens purpureo-flammea, schönbunte, grau-lilafarbige, mit Purpurflammen und Streifen	6	20
130 violac. chermes. latemarg. violette m. carmosinr. eingef.	6	16	194 isabellina pallida grandiflora, große hellisabellfarbige	6	8
131 coccinea sordida, trübscharlachrothe	6	8	195 rufa subt. gilva sphaer., knosf. fahlr. trübgelb durchsch.	5	8
132 atropunicea sordida trüblutigrothe	5	6	196 rubra sord. subt. gilva mult., vielbl. schmutzgr. unt. trübgelb	6	6
133 fulva grandiflora, große gelbbraune	5	6	197 cinnabar. canesc. multifi., vielbl. zinnober. in grau zieh.	4	8
134 atroamaranth. int. nigrescens max. größte dunkelamaranthfarbige, innen heraus schwarz T.	6	12	198 coccineo-sanguinea splendens subt. violacea, glänzend scharlachblutrothe, unten violett	6	18
135 luteo-fusca tenella, zarte gelbbraunliche T.	5	10	199 nigro caerulea, holosericea rhomboid., eckiggebaute schwarzblaue mit Sammt	6	16
136 nivea amoena, sanft schneeweiße	7	8	200 atroamaranthea, chermesina semifist., diethenförmige, dunkelamaranthcarmosinfarbige in halber Kugelform	7	18
137 citrina, croceo cineta, zitrongelbe m. safranf. Umkreis	6	12	201 aurantiaca-canescens maxima, größte und vollendeste orangefarbige, mit grauem Schein T.	5	24
138 ochraceo-lutescens, florib., reichblühende gelbockerfarbige	4	10	202 amaranthea, carminea holosericea subt. argentea, ausgezeichnete amaranthcarminfarbige, mit kleinen weißstreifigen Blättchen, unten silberweiß T.	5	36
139 luteo-miniata monstr., monstr. gelbe m. mennigr. schatt.	7	6	203 atropurp. nigro-holos., dunkelpurpurf. m. schw. Sammt	5	12
140 atrocaerulea rosaeform., rosenähnliche schwarzblaue	5	6	204 aurea, rubro-striata, goldf. m. roth gestammt u. gestreift	4	12
141 atropurpureo-caerulea, dunkelpurpurblaue	5	8	205 aurea, rubra striata, goldf. m. roth gestreift u. gestammt	5	8
142 cerina, rubro-varieg., bunte, wachsgelbe mit roth schatt.	5	12	206 caerulea-rosea pall., blaulich-hellrosafarbige T.	5	10
143 aurea, miniata flammea speciosa, prachtvolle goldfarbige, mennigroth gestammt und fein gesäumt T.	5	24	207 albida suave roseo-diluto amoena, sanftweißliche, überzogen m. rosa, welches nach den Spizen zu lichter wird T.	5	24
144 carminea praenitens, förmliche feurig-carminrothe T.	5	16	208 coccineo-phoenicea, hochscharlachfeuerfarbige mit kleinen weißlichen Blättchen	7	16
145 aurorans pellucida, schimmernd aurorafarbige	5	8	209 lilaceo-caerulescens, zarte lilabläuliche	5	10
146 coccineo crocea praecox, frühblüh. safranscharlachfarbige	6	8	210 coccin. chermes. praecox, frühbl. scharl. carmosinr. T.	5	12
147 atroviolacea multiflora, vielblumige dunkelviolette	5	6	211 chermesino-amaranthacea, carmosin-amaranthfarbige	5	8
148 flavo-miniata crispa- kraußblättrige gelbmennigrothe	5	6	212 purpureo-sanguinea subt. violacea, vielblumige dunkelpurpurblutrothe, unten violett	5	10
149 aurea, rubro-varieg. florib., reichlichblühende hochgelbe m. lebhaften roth gestammt T.	5	24	213 coccinea spec., große, prachtvolle, rein scharlachrothe T.	6	24
150 lilaceo-caerulesc. subt. canesc., helllilablau unt. grau	6	12	214 cocc.-sang. holos. undul., wellenbl. glanz. schwichbltr. T.	5	18
151 atroviolacea, canescens holosericea, dunkelveilchenblaue mit sanftgrauem Sammt überzogen T.	5	8	215 atrococcinea purpurascens, schwarz-scharlachfarbige mit Purpur durchdrungen	5	12
152 rubro-fusca multiflora, vielblumige bräunlich-rothe	5	8	216 cerina, miniata late marg., wachsgelbe mit breiten mennigrothem Rande	4	6
153 rosea, caeruleo-hyalina, sanft rosaf., hellblau durchsch. T.	5	12	217 coccineo-haematit., scharlachrothe mit röthelroth getrübt	5	8
154 pall. viol. int. lact., niedr. blasviol. inn. hera. weißl. T.	4	6	218 atrocaerulescens altissima, höchste schwarzblaue, mit kleinen weißstreifigen Blättchen	7	10
155 lateritio-fulgescens, gelblich-feuerfarbige	5	8	219 croceo-miniata, tief safran-mennigrothe	5	8
156 purpurea nitida subt. pall., leucht. purpurf. unt. heller	5	8			
157 rubro-livida semifist., diethenf. rothe mit bleif. Spizen	5	12			
158 atroamaranth. chermesina triflora, dreiblumige, prächtige dunkelamaranthcarmosinrothe T.	6	12			

	gr	Fußhöhe.
uscato-purpureo semifistulosa, dietchenformige, bräunlichpurpurfarbige, halbkugelgestaltige T.	5	20
roseo-violacea triflora, dreibl. violett-rosenfarbige T.	6	12
citrina flavescens gigantea, riesengroße, häufig blühende dunkelgelbe, innerlich zitrongelb T.	5	24
atrocerisea holosericea splendens, firschschwarze mit glanzvollen Sammt T.	6	24
haematitica grandiflora, große röthelrothe	6	8
coccin. flavesc. florib., blumenreiche gelbl. scharlachf. T.	4	12
citrina grandiflora, große zitrongelbe	6	12
violacea, lacteo-venosa, violette mit milchweißen Adern	5	16
rubro-cana multiflora, vielblumige graurolhe T.	5	12
cocc.-sang. int. aurea, scharlachblutrothe, innen goldfab.	7	8
sulphurea pall. lucida, leuchtend gg. bläuschweißgelbe	6	3
aurea satur. cinereo-varieg., dunkelgoldfarbige, äußerlich rosa-grau überzogen	5	6
fusca-sanguinea holosericea fulgens, bräunl. blutrothe mit glänzenden Sammt	6	12
aurea, carmineo-variegato, goldfarbige, von den Spizen herein lebhaft karmin T.	5	12
cinnabarina splendens, glänzend zinnoberrothe	7	18
sulph. pall. rubic., bläuschweißgelbe röthl. kreisr. angeh.	5	8
alba vera, rein weisse	7	8
purpurea splendens nigro-cincta int. nigerrima, durchglänz. purpur, breit-schwarz umfaßt, innen gg. schwarz T.	6	240
miniata sordida multifi., vielblumige trübrolhe	5	8
flavesc., rubro-varieg., dunkelgelbe mit roth überw. T.	3	8
puniceo-hermesina, blutig-carmosin	3	8
sulphurea albid. speciosa, prachtvolle, bläuschweißgelbe, nach den Spizen in weisse übergehend T.	5	48
violacea purpurea, violett-purpurfarbige T.	5	3
violac. mutab. veränderlich viol., nach außen verschief. T.	3	16
citrina splendens, samtigglänzend-zitrongelbe	6	12
nigro-fusca, violacea perucidans, Scabiosenähnliche, schwarzbraune in violett übergehend T.	4	12
purp.violac. anemonifl., anemonenähn. violett-purp. T.	4	16
luteo-carm. anemonifl., anemonenähn. gelbcarmin. T.	4	16
atrococcinea tricuspidata anemoniflora, anemonenähnliche dunkelscharlachrolhe mit dreispizigen Blättern T.	4	16
rosea spect. anemonifl., prächt. rosaf. in Anemonenform	6	16
sanguinea anemonifl., anemonenähnliche blutrolhe	4	16

Um den Freunden dieser überaus schönen und prächtigen Gartenpflanze die Auswahl zu erleichtern und selbst den Unbemittelten die Erlangung schöner Sorten um einen äußerst billigen Preis zu ermöglichen, habe ich aus den hier oben angeführten, einzig nur

Prachtforten enthaltenen Sortiment, kleinere Parthieen mit niedrigen Preisen bestimmt. Es werden daher:
12 Stück in eben so viel schönen, nach meiner Wahl ausgewählte unter den zwar schon bekannten, jedoch bewährtesten Sorten, mit den Preis von 6—12 Gr. für 2 Zhlr. 8 Gr.
12 Stück nach meiner Wahl ausgewählt, unter den Sorten von 8—18 Gr. für 3 Zhlr. 12 Gr.

50 Stck. dergl. für 15 Zhlr. 100 Stck. dergl. f. 32 Zhlr. abgegeben.
Bei der Auswahl wird stets darauf gesehen, daß unter 12 St. die Hauptfarben, unter 50 und 100 Sorten dieselben mit allen ihren Abstufungen und buntfarbigen Arten erwählt werden.

Eine Farbensufenleiter in ganz reinen Farben, von der lichtesten anhebend und bis zur dunkelsten übergehend, in 25 vorzüglichen Sorten für 9 Zhlr.

25 vorzügliche Sorten, bloß buntfarbige für 12 Zhlr.

Zu größern Parthieen und Anlagen, biete ich mein ganzes in 600 gefüllten Sorten bestehendes Sortiment an, und erlasse davon unter Angabe der Farben

500 Stück in 2—300 Sorten für 55 Zhlr.

1000 „ „ 3—400 „ „ 100 „

1000 „ in Kommet „ 60 „

Ich habe vorgezogen, die oben aufgeführten Georginen, streng nach ihren Farben, unter zu Grundlegung einer Farben-Ansicht und nach genauer Vergleichung der Blumen miteinander, zu benamen. Den Georginenfreunden hoffe ich es erleichtert zu haben, die ihnen fehlenden Farben besser herauszufinden; besonders wenn sie schon im Besitze einiger Georginen mit Hauptfarben aus meinem Sortiment sein sollten. Sie können um so zuverlässlicher darauf rechnen, keine Doubletten zu erhalten, als fast mein ganzes Sortiment durch künstliche Befruchtung und Kreuzung untereinander verwandter Farben, selbstgewonnene, seltene Originalien enthält, welche jeglichen Kenner interessieren dürften; besonders werden die in höhern Preis gestellten Georginen die Seltenheit der Formen und Färbung und zugleich den erreichten Höhepunkt der Cultur bekräftigen.

Ein großer Theil vorzüglicher Georginen eignet sich auch zu einer vorzüglichen Flor in großen Blumentöpfen. Alle hierzu passende sind mit T. bezeichnet. Und um die Georginen in Gruppen hintereinander sichtbar aufstellen zu können, habe ich auf einem freien Standorte die Fußhöhe derselben vermessen u. solche bei jeder Sorte mit Zahlen angegeben.

Die Versendung der Georginen-Knollen erfolgt gegen Ende März oder Anfangs April, nachdem die Witterung hierzu günstig ist. Die Knollen werden so vorbereitet versendet, daß sie beim Empfang sofort an ihren Ort verpflanzt werden können.

B. K a r t o f f e l = S o r t i m e n t

der gebräuchlichsten und neuesten Sorten.

- | | |
|---|---|
| 1. Feine mehlig, englische ganz frühe Kartoffeln, Winter, | 26. große Vieh: |
| 2. holländische blaublühende, | 27. achte Perchen, ganz vorzüglich zum Ganzkochen, |
| 3. vorzüglich große mehlig Futter: | 28. rothblau marmorirte, |
| 4. lange, ganz frühe, | 29. reichlichtragende weisse, |
| 5. englische Rostbeef: | 30. peruanische, |
| 6. frühe, neue englische Forz-Early: | 31. Wachholder: |
| 7. sehr frühe englische Mißbeet: | 32. kleine Ruz: |
| 8. „ „ neu amerikanische, | 33. blaue Horn: |
| 9. lange eschenblättrige Nieren: | 34. Rocks: |
| 10. immerwährende, *) | 35. frühe, volltragende, rothe, |
| 11. englische Spargel: | 36. Kastanien: |
| 12. wilde, | 37. kleine, runde, blaue, |
| 13. lange schwarzblaue, | 38. englische große, |
| 14. Zwittergestaltige, | 39. lange, rothe Nieren: |
| 15. neue mexikanische, | 40. „ weisse: |
| 16. frühe, glatte, weisse, | 41. gelbe Zapfen: |
| 17. schottländische, | 42. Buisquit: |
| 18. beste Speise: | 43. Zucker: |
| 19. Preis von Hollands: | 44. frühe gelbrothe, |
| 20. Zwiebel: | 45. rauchschalige, rothe, vortreffliche Speise: |
| 21. volltragende Gurken: | 46. lange, volltragende, spärgute, |
| 22. Preis von Westerbalds: | 47. Mandel: |
| 23. gelbe Patata: | 48. unter u. über der Erde am Stengel wachsende Kart. |
| 24. frühe, hellrothe, volltragende Pfälzer: | |

*) Um diese Kartoffel das ganze Jahr hindurch frisch zu haben, wird im Frühjahr zeitig eine Aussaat, eine spätere im Juli unternommen. Diese letztere bleibt den Winter über in der Erde und wird mit ihrem eigenen Laube oder Stroh gegen eindringenden Frost geschützt. Bevor die Keimkraft im Frühjahr erwacht, wird die Kartoffel der Erde entnommen, und im Keller im trocknen Sand verwahrt, wo sie alsdann bis Johanni schmackhaft bleibt.

C. Einige der schönblühendsten perennirenden Landpflanzen.

	1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.
Achillea alpina	3	Aquilegia sibirica	3	Chelone glabra	6
— Ageratum	3	— viscosa	3	— obliqua	4
— asplenifolia	3	— vulgaris	2	— fl. albo	6
— ciliata	2	Arabis collina	2	Chrysanthemum roseum	6
— distans	2	Armeria latifolia	3	Chrysocoma Lynosiris	3
— grandiflora	2	— plantaginia	3	S. Cineraria cordifolia	3
— Impatiens	2	Arnica doronicoides	3	— corymbosa	3
— mongolica	2	— scorpioides	3	— glabrata	3
— magna	2	Asphodelus luteus	4	— robusta	3
— millefol. fl. rosea	2	— tauricus	4	— sibirica	3
— paradoxa	3	Asclepias pulchella	4	Clematis angustifolia	3
— peregrina	2	— sibirica	2	— campaniflora	3
— ptarmica fl. pl.	3	— Siegmanni	4	— erecta	3
— setacea	2	Aster alpinus altaicus	4	— integrifolia	3
— speciosa	3	— altaicus	3	— hispanica	3
— tanacetifolia	3	— amellus	3	— viticella	4
S. — tomentosa	5	— amygdalinus	3	— fl. pl.	8
S. Acanthus cardifolius	4	— cordifolius	2	S- Convallaria bracteata	8
Aconitum album	3	— elegans	3	— majalis	1
— barbatum	3	— ericoides	3	— multiflora	3
— Cammarum	3	— grandiflorus	6	S. Coreopsis Atkinsoniana	6
— leucanthemum	3	— macrophyllus	2	— auriculata	3
— Napellus	2	— novae Belgii	3	— lanceolata	3
— — bicolor	3	— paniculatus	2	— tenuifolia	4
— neomontanum	3	— punctatus	3	— tripteris	3
— nitidum	6	— salignis	2	— undulata	3
— sibiricum	3	— spectabilis	3	Coronilla Emerus	3
— variegatum	3	Astragalus alopecuroides	3	— varia	3
— volubile	6	— galegiformis	3	Corydalis aurea	3
S. Adenophora denticulata	3	— Laxmannii	2	— capnoides	3
— communis	3	Astrantia heterophylla	6	— fungosa	3
— marsupiflora	3	— major	3	Cucubalus fimbriatus	3
Actaea racemosa	6	Aubertia deltoidea	2	S. Cynanchum fuscum	4
— spicata	3	Bellis perennis, div. Coul.	1	Cynoglossum bicolor	2
Agrostemma coronaria	2	Betonica grandiflora	3	— pictum	2
S. — — fl. pl.	8	— incana	3	— omphaloides	1
— — fl. Jovis	3	— orientalis	3	— virginicum	2
Althaea narbonensis	2	— stricta	3	Cypripedium Calceolus	4
— rosea fl. pl. in 30	2	Boltonia glastifolia	3	Delphinium amoenum	3
div. Farben	2	Buphthalmum grandifl.	4	— grandiflorum	3
das Dug. 18 Gr.	2	— cordifol.	3	— dystiocarpum	4
Allium globosum	4	— helianth.	3	— elegans fl. pl.	6
— Moly	2	Cacalia Saracenicica	3	— hirsutum	3
— narzissifolium	6	Caltha palustris	3	— Stavisagria	6
— odorum	3	Campanula divergens	3	Dianthus atrorubens	2
— paniculatum	3	— farinosa	3	— Carthusian fl.	2
— purpureum	2	— gracilis	3	— pl.	2
— roseum odoratum	4	— grandiflora	4	— chinensis 1 Dtz.	1
— sphaerocephalum	4	— gummifera	3	4 Gr.	1
S. Ammobium alatum	6	— lilifolia	3	— deltoides	1
Anchusa capensis	4	— marcantha	3	— glaucus	1
— italica	2	— Medium fl. pl.	2	S. — japonicus	6
— variegata	3	— obliquaefolia	2	S. — odoratus fl. pl.	6
Anemone hepatica fl. ru-	3	— persicifolia pl.	3	— plumarius	1
bro pl.	3	— fl. pl.	4	— Dtz. 3 Gr.	1
Anthericum Liliago	3	— albo	4	— max.	3
Antirrhinum majus	1	— pulla	3	— fl. pl.	3
— 12 Stck. in div.	4	— pyramidalis	4	— pulchellus	2
— Coul.	4	S. — fl. albo	12	— versicolor	2
— maj. bic. prächt.	2	— sibirica	4	— caryophyllus	2
— 12 Stck. 12 Gr.	3	— speciosa	4	Samlinge von aus-	
— dalmaticum	3	— suaveolens	4	gezeichneten Gat-	
— jamajense	3	Cassia marylandica	4	tennellen 1 Dugb.	
— mollis	1	Catananche caerulea	3	6 Gr.	
— montevidense	2	Centaurea atropurpurea	2	Dictamnus Fraxinella	4
Apocynum androsaemi-		— austriaca	2	Digitalis alba	2
folium	4	— glastifolia	4	— Eriostachis	2
— venetum	4	— macrophylla	4	— fuscescens	2
Aquilegia alpina	3	— ochroleuca	2	— grandiflora	2
— canadensis	4	— orientalis	3	— lanata	2
— grandiflora	3	— spathulacea	2	— lutea	2
— praecox	3	— strobilacea	3	— purpurea	2
— stellata	3	S. Chelone barbata	4	— Winterlü	3
— striata	3	S. — campanulata	4	Dodecatheon Meadia	4

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer